

Chiave analitica del genere *Bolbitius*

- 1a Cappello bianco o giallo 2
1b Cappello di differente colorazione 3
2a Cappello bianco fin da giovane *B. lacteus*
2b Cappello giallo Gruppo *B. vitellinus*
(*B. vitellinus*, *B. titubans*, *B. fragilis*, *B. flavidus*, *B. boltonii*)
3a Cappello grigio, con varie sfumature 4
3b Cappello di differente colorazione 6
4a Cappello grigio argentato *B. pluteoides*
4b Cappello grigio-lilla, grigio-violaceo, su legno 5
5a Cappello inizialmente grigio con successiva tendenza al giallo sporco, striato fino al disco, senza reticolazioni-venature *B. aleuriatus**
5b Cappello grigio con sfumature violacee, pochissimo striato, con reticolazioni-venature *B. reticulatus**
6a Cappello olivastro, con reticolazioni brune \pm evidenti *B. variicolor*
6b Cappello rosa carnicino *B. demangei*

N.B.: Le specie contrassegnate con (*) sono da molti autori considerate appartenenti al genere *Pluteolus*.

Bibliografia

- R. Kühner - H. Romagnesi, 1953, *Flore analitique des champignons supérieurs*, pag. 348.
B. Cetto, 1979, *I funghi dal vero*, 3° volume: n. 906.
M. Moser, 1980, *Guida alla determinazione dei funghi*.
H.C., 1982, *Bolbitius o Pluteolus?*, I nostri funghi, anno 5 (5): 13.
R. Watling, 1982, *British fungus flora agarics and boleti*, 3, Bolbitiaceae: 34.
L. Blatto, 1984, *Brevi note e osservazioni sui generi Bolbitius, Pluteolus e relative specie*, I nostri funghi, anno 7 (2): 7-14.
R. Singer, 1986, *The Agaricales in modern taxonomy*, pag. 550.