TASSONOMIA

Chiave per la determinazione delle specie del genere Lepista in Italia:

1	lamelle lungamente decorrenti, aspetto da Clitocybe
1*	lamelle adnato-annesse o solo brevemente decorrenti, aspetto da <i>Tricholoma</i> 10
2	basidiocarpi interamente bianchi, con lamelle rosa
2*	basidiocarpi colorati, almeno nel cappello
3	normalmente fruttificanti cespitose o fascicolate
3*	normalmente densamente gregarie ma non o raramente cespitose
4	cappello grigio-bruno o bistro, con guttule nerastre

4*	cappello bruno-mattone, senza guttule	a
5	basidiocarpi grigi o grigio-bruni	5
5*	basidiocarpi con colorazioni differenti	7
6	ornamentazione sporale costituita da spinule grossolane e distanziate,	
	basidiocarpi grigio-bruni piuttosto scuri, cappello radialmente fibrilloso L. masiae	e
6*	ornamentazione sporale costituita da spinule sottili e fitte,	
	basidiocarpi grigio-cinerognoli piuttosto chiari, cappello	
	non fibrilloso radialmente	S
7	sporata gialla, basidiocarpi bruno-cannella	
7*	sporata rosa, basidiocarpi di colore diverso	
8	ornamentazione sporale costituita da spinule sottili e fitte, basidiocarpi	
	interamente giallastri pallidi	S
8*	ornamentazione sporale costituita da spinule grossolane e distanziate	
9	cappello tomentoso o areolato, da aranciato a bruno-mattone, con	
	guttule più scure, ife della pileipellis con pigmento intraparietale L. lentiginoso	а
9*	cappello liscio, sericeo, da rossastro a giallo-aranciato,	
	talora giallo, senza guttule, ife della pileipellis con pigmento	
	vacuolare)
10	basidiocarpi, almeno alla base del gambo, con toni viola o lilla	
10*	basidiocarpi senza queste colorazioni	
11	odore forte e sgradevole, terroso, basidiocarpi lilla-ametistini pallidi L. graveolen.	
11*	odore aromatico oppure poco pronunciato	
12	odore aromatico, basidiocarpo lilla-rosa poi bianco	
12*	odore nullo o poco marcato, colorazioni più accentuate	
13	carne di un blu-viola molto vivo, cappello non igrofano	
13*	carne biancastra o pallida, cappello fortemente igrofano	
14	cappello grigio-bruno, gambo viola-ametista carico, lamelle rosate L. saevo	
14*	cappello con toni viola, gambo con toni viola meno accentuati,	
	lamelle viola	5
15	taglia gracile, cappello disteso con centro depresso	
15*	taglia robusta, cappello convesso, non depresso al centro	
16	odore forte, dolciastro, come di Iris	
16*	odore diverso oppure assente	
17	spore ellissoidi, non più lunghe di 6 μm, basidiocarpi grigio-bruni L. bohusi	
17*	spore ellissoidi-allungate fino a fusiformi, sovente lunghe oltre 8 µm	
18	spore ellissoidi-allungate, basidiocarpi rosa-biancastri	
18*	spore subfusiformi o fusiformi, basidiocarpi brunastro-isabellini L. irinoide	
19	basidiocarpi interamente bianchi, talvolta con sfumature rosate	
19*	basidiocarpi di colore differente	
20	sapore acre, pepato, nei prati o al margine dei boschi L. riceki	
20*	sapore dolce o insignificante, nei boschi, su fogliame	
21	spore grandi, normalmente più lunghe di 6 µm	
21*	spore piccole, normalmente non più lunghe di 6 µm	
22	basidiocarpi grigio-bruni, cappello con guttule nerastre,	J
	odore farinoso	а
	odore rarmoso L. panaeou	r

22*	basidiocarpi bruno-vinosi, cappello non guttulato, odore di
	cumarina L. multiformis
23	cappello grigio-bistro con squamette nere adnate
23*	cappello più chiaro e senza squamette
24	spore ad ornamentazione costituita da verruche pronunciate e fitte,
	basidiocarpi da grigi a grigio-bruni, non flaccidi, soprattutto
	nei prati
24*	spore ad ornamentazione costituita da verruche piccole e distanziate,
	basidiocarpi da beige a bruno-vinosi, presto flaccidi, soprattutto
	nei boschi