

vesso, infine anche $\pm$ aperto; in condizioni di umidità con margine striato; colori predominanti dal bruno-ocra (bruno-fulvo) all'ocra-giallastro; $\pm$ igrofano.

Anello membranoso, persistente o $\pm$ caduco, profondamente striato nella faccia interna.

Spore bruno-ruggine, $\pm$ ellittiche, con poro germinativo tranne che in una specie che da questa condizione prende il nome (*P. aporos*).

Trama lamellare regolare con mediostroto ben sviluppato.

Cheilocistidi ialini, a parete sottile, ventricosi, lageniformi, subcilindrici, claviformi, anche subcapitulati ma con capitulo mai bruscamente definito.

Pleurocistidi assenti.

Epicute di tipo imeniforme, formata da

elementi globoso-pedunculati, piriformi o subisodiametrici.

Giunti a fibbia presenti, di solito in tutte le giunzioni.

Habitat in terreno con humus, su foglie o frustuli legnosi marcescenti, tra l'erba, in parchi e giardini, ma anche nei boschi.

Interpretazione dei taxa

Gli epiteti *blattaria*, *teneroides* e *togularis* sono stati utilizzati, in letteratura, con interpretazioni spesso discordanti. In queste note la definizione usata per i taxa studiati è quella impiegata da M. Moser nella quinta edizione della sua "*Flora*" (1983), poiché anche lo stesso Autore ha cambiato, nel corso delle varie edizioni, il senso dei taxa descritti.

Chiave di determinazione

1. Spore con poro germinativo; carpofori con crescita preferenziale in autunno ... 2
- 1a. Spore senza poro germinativo; carpofori crescenti all'inizio della primavera *P. aporos* (Kits van Wav.) Clém.
2. Spore con lunghezza minore di 10 u. 3
- 2a. Spore con lunghezza maggiore di 10 u. 5
3. Cappello piccolo (0,5 - 1,5 cm), $\pm$ campanulato ed a lungo con questa forma, ocraceo-giallastro; anello poco persistente; cheilocistidi lageniformi *P. filaris* (Fr.) Sing.
- 3a. Cappello in media più grande; cheilocistidi diversi 4
4. Cappello 1,3 - 2,5 cm, bruno-ocraceo, bruno-rossastro nell'umbone; cheilocistidi subcilindrici, ventricoso-cilindranei, a volte con apice appena dilatato *P. arrhenii* (Fr.) Sing.
- 4a. Cappello 2-4 cm; cheilocistidi largamente claviformi o ventricosi ma con apice di solito molto allargato *P. hadrocystis* (Kits van Wav.) Court.
5. Basidi bisporici 6
- 5a. Basidi tetrasporici *P. blattaria* (Fr.) Fayod
6. Cheilocistidi subglobosi, claviformi o lageniformi ma larghi *P. teneroides* (J. Lange) Sing.
- 6a. Cheilocistidi $\pm$ lageniformi con collo stretto *P. filaris* (Fr.) Sing.